

Листівка вкладка
дієтична добавка з підсолоджувачем

АТОКСІЛ ГЕЛЬ® КІДС

ATOXIL GEL® KIDS

ЕНТЕРОСОРБЕНТ | НЕ МІСТИТЬ ЦУКРУ

Гель для внутрішнього використання.

Склад одного стік-пакета, 20 г (g) гелю: високодисперсний діоксид кремнію - 1,6 г (g) (8%*); допоміжні речовини: вода очищена, згущувач натрію карбоксиметилцелюлоза Е466, ароматизатор «груша - банан», підсолоджувач сукралоза Е955, регулятор кислотності лимонна кислота Е330, консервант калію сорбат Е202.

*- кількість інгредієнта від загальної маси 1 стік-пакета.

Форма випуску: стік-пакети по 20 г (g) гелю, по 4 та 10 стік-пакетів в пачці з картону.

Рекомендації до споживання: Може бути рекомендований як продукт, що має у складі діоксид кремнію з метою підтримання нормальної роботи організму.

Діоксид кремнію сприяє:

- зв'язуванню та виведенню ендо- і екзогенних сполук з організму у разі потенційних ризиків інтоксикації при відхиленнях від звичайного раціону харчування;
- нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту та зменшенню симптомів дискомфорту, таких як важкість;
- нормальному здійсненню детоксикаційних процесів в організмі.

Спосіб споживання та рекомендована добова кількість: дітям від 3 до 7 років по 1 стік-пакету 2 рази на добу; дітям від 7 до 14 років по 1 стік-пакету 3 рази на добу. Використовувати за годину до або через годину після прийому їжі чи медикаментів. Перед вживанням гель зробити однорідним, шляхом розминання пакета. Вміст пакета вилити у столову ложку або безпосередньо в ротову порожнину. Рекомендовано запивати склянкою води.

Для детальної інформації див. листок вкладку.

Рекомендована тривалість споживання від 3 до 14 діб. Можливість повторного курсу слід узгоджувати з лікарем.

Не є лікарським засобом.

Дієтична добавка не може бути заміною повноцінного і збалансованого раціону харчування та здорового способу життя.

Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.

Без ГМО.

Застереження при споживанні: Не слід споживати за індивідуальної чутливості до будь-якого компонента та дітям віком до 3 років. Продукт містить підсолоджувач, тому його рекомендовано вживати з обережністю дітям із цукровим діабетом.

Не перевищувати рекомендовану добову кількість для щоденного споживання.

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі повітря не вище 25°C та відносній вологості не більше 75%, у захищеному від світла та недоступному для дітей місці.

Термін придатності: 2 роки

Маса нетто: 80 г (g); 200 г (g).

Номер партії (серії) та дата завершення мінімального терміну придатності

«Краще спожити до кінця (місяць/рік)»: зазначені на пачці.

Оператор ринку (виробник): ТОВ «Орісіл-Фарм», Україна, 79008,

м. Львів, вул. Лесі Українки, 43/11А,

тел.: +380 322 970-406, e-mail: orisilpharm.feedback@gmail.com

Виробничі потужності: Україна, 77300, Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Заводська 1 Б.

ТУ У 10.8-32640291-006:2019

