

дієтична добавка з підсолоджувачем

АТОКСІЛ ГЕЛЬ® ПЕЧІЯ

ATOXIL GEL® HEARTBURN

Гель для внутрішнього використання. Не містить цукру.

Склад одного стік-пакета, 20 г (г) гелю: діоксид кремнію високодисперсний – 1200 мг (mg) (6%*), кальцію карбонат – 300 мг (mg) (1,5%*), магнію гідроксид – 300 мг (mg) (1,5%*), натрію гіалуронат – 0,015 г (g) (0,075%*); допоміжні речовини: вода очищена, загущувач натрій-карбоксиметилцелюлоза Е466, регулятор кислотності лимонна кислота Е330, консервант сорбат калію Е202, ароматизатор «Персик та м'ята», підсолоджувач сукралоза Е955.

* - кількість інгредієнта від загальної маси 1 стік-пакета.

Рекомендації щодо споживання: може бути рекомендований як джерело мінералів кальцію карбонату, магнію гідроксиду та продукт, що має у складі діоксид кремнію, природний мукополісахарид натрію гіалуронат з метою підтримання нормальної роботи організму.

Діоксид кремнію високодисперсний має високу сорбційну активність з великою сорбційною площею, без змін проходить шлунково-кишковий тракт і виводиться з організму. Вискодисперсний діоксид кремнію сприяє абсорбції та виведенню подразнюючих речовин, зокрема жовчних кислот, які в результаті закиду кислого шлункового вмісту потрапляють в стравохід. Сприяє нормальному функціонуванню шлунково-кишкового тракту при печії, легшому перенесенню дискомфорту з боку шлунково-кишкового тракту, такого як важкість в шлунку, інші стани, що супроводжуються надмірною кислотністю шлункового соку. Натрію гіалуронат – сіль гіалуронової кислоти – природний мукополісахарид, який має здатність утворювати на поверхні слизової оболонки шлунка та стравоходу тонку гелеву захисну плівку (механічний бар'єр), що обволікає нервові закінчення й сприяє легшому перенесенню дискомфортних відчуттів. Натрію гіалуронат сприяє нормальному здійсненню бар'єрної функції слизової оболонки шлунка та стравоходу. Кальцію карбонат та магнію гідроксид сприяють підтриманню нормальної кислотності шлункового соку шляхом нейтралізації соляної кислоти. Кальцію карбонат та магнію гідроксид володіють взаємодоповнюючою дією. Вважається, що магнію гідроксид починає діяти швидше, але ефект короткотривалий, тоді як кальцію карбонат має повільнішу, але більш довготривалу дію.

УВАГА! Повторення печії може бути симптомом захворювання шлунково-кишкового тракту. У такому разі рекомендуємо звернутися до лікаря.

Спосіб споживання та рекомендована добова доза. Дорослим та дітям від 12 років по 1 стік-пакету до 6 стік-пакетів на добу. Вживати через годину після приймання їжі та медикаментів. Перед використанням суспензію слід зробити однорідною шляхом розминання пакета. Вміст пакета слід вилити у столову ложку або безпосередньо в ротovu порожнину. Рекомендовано запивати склянкою води.

Застереження при споживанні. Не слід споживати за індивідуальної чутливості до будь-якого компонента та дітям віком до 12 років. Не перевищувати рекомендовану кількість для щоденного споживання. Дієтична добавка не може бути заміною повноцінного і збалансованого раціону харчування та здорового способу життя. Продукт містить підсолоджувач, тому його рекомендовано вживати з обережністю людям із цукровим діабетом. Не слід вживати при непротікності кишечника, шлунково-кишкової кровотечі. Не рекомендується застосовувати при загостренні виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки, атонії кишечника. Перед використанням рекомендована консультація лікаря. Не є лікарським засобом. Без ГМО.

Форма випуску: стік-пакети по 20 г (г) гелю, 4 або 10 стік-пакетів в паці з картону.

Маса нетто: 80 г (г), 200 г (г).

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі повітря не вище 25 °C та відносній вологості не більше 75%, у захищеному від світла та недоступному для дітей місці.

Номер партії (серії) та дата завершення мінімального терміну придатності «Краще спожити до кінця (місяць/рік)»: зазначені на паці.

Термін придатності: 2 роки.

Оператор ринку (виробник):

ТОВ «Орісіл-Фарм», Україна, 79008,
м. Львів, вул. Лесі Українки, 43/11А,
тел.: +380 322 970 406, e-mail: orisilpharm.feedback@gmail.com

Виробничі потужності:

Україна, 77300, Івано-Франківська область,
м. Калуш, вул. Заводська, 1Б.

ТУ У 10.8-32640291-007:2020

