


дієтична добавка з підсолоджувачем

АТОКСІЛ ГЕЛЬ® преБІО

ATOXIL GEL® preBIO

ЕНТЕРОСОРБЕНТ | ПРЕБІОТИК | БЕЗ ДОДАВАННЯ ЦУКРУ

Гель для внутрішнього використання.



Склад одного стік-пакета, 20 г (г) гелю:

діоксид кремнію високодисперсний – 1,8 г (г) (9%*),

лактоза – 0,4 г (г) (2%*);

допоміжні речовини: вода очищена, консервант сорбат калію E202,

загущувач натрій-карбоксиметилцелюлоза E466,

регулятор кислотності лимонна кислота E330,

ароматизатор «Полуниця», підсолоджувач сукралоза E955.

* - кількість інгредієнта від загальної маси 1 стік-пакета.

Рекомендації щодо споживання:

може бути рекомендований як продукт, що має у складі діоксид кремнію високодисперсний та пребіотик лактулозу з метою підтримання нормальної роботи організму.

Діоксид кремнію високодисперсний сприяє:

- зв'язуванню та виведенню ендо-і екзогенних сполук з організму у разі потенційних ризиків інтоксикації при відхиленнях від звичайного раціону харчування;
- підтриманню нормальної роботи шлунково-кишкового тракту.

Лактулоза – це пребіотик, який сприяє підтриманню нормального стану мікрофлори кишечника.

Спосіб споживання та рекомендована добова доза. Дорослим та дітям від 14 років по 1 стік-пакету 3 рази на добу. Дітям від 3 до 7 років по 1 стік-пакету 1 раз на добу та дітям від 7 до 14 років по 1 стік-пакету 2 рази на добу. Вживати за годину до або через годину після приймання їжі та медикаментів. Перед використанням суспензії слід зробити однорідною шляхом розминання пакета. Вміст пакета слід виливати у столову ложку або безпосередньо в ротову порожнину. Рекомендовано запивати склянкою води.

Термін споживання зазвичай становить від 3 до 10 діб. Можливість повторного курсу слід узгоджувати з лікарем.

Застереження при споживанні. Не слід споживати за індивідуальної чутливості до будь-якого компонента та дітям віком до 3 років. Не перевищувати рекомендовану кількість для щоденного споживання. Дієтична добавка не може бути заміною повноцінного і збалансованого раціону харчування та здорового способу життя. Продукт містить підсолоджувач, тому його рекомендовано вживати з обережністю людям із цукровим діабетом. Не слід вживати при непрохідності кишечника, шлунково-кишкової кровотечі. Не рекомендується застосовувати при загостренні виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки, атонії кишечника. Перед використанням рекомендована консультація лікаря. Не є лікарським засобом. Без ГМО.

Форма випуску: стік-пакети по 20 г (г) гелю, 4 або 10 стік-пакетів в пачці з картону.

Маса нетто: 80 г (г), 200 г (г).

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі повітря не вище 25 °C та відносній вологості не більше 75%, у захищеному від світла та недоступному для дітей місці.

Номер партії (серії) L та дата завершення мінімального терміну придатності «Краще спожити до кінця (місяць/рік)»: зазначені на пачці.

Термін придатності: 2 роки.

Оператор ринку (виробник):

ТОВ «Орісіл-Фарм», Україна, 79008, м. Львів, вул. Лесі Українки, 43/11А,
тел.: +380 322 970 406, e-mail: orisilpharm.feedback@gmail.com

Виробничі потужності:

Україна, 77300, Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Заводська, 15.

ТУ У 10.8–32640291–006:2019